



Advanced Practitioner Solutions LLC
13195 SW 134th Street, Unit# 102
Miami, Florida 33186

WEIGHT MANAGEMENT WAIVER FORM

La Semaglutida pertenece a una clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. Su receta junto a una dieta baja en calorías y un incremento en actividad física para controlar el sobrepeso en adultos cuyo índice de masa corporal es considerado fuera del rango saludable.

Mientras usa Semaglutida es recomendable:

- Comer una dieta rica en fibras. Enfóquele en las frutas y vegetales que son altos en fibra
- Consuma los alimentos ricos en proteínas en porciones mas pequeñas ya que con este medicamento su digestion es mas lenta
- Evite las comidas altas en grasas ya que se demoran mas en digerir
- Limite el consumo de bebidas alcohólicas ya que este medicamento puede bajarle la presión arterial
- Debe tomar por lo menos 32oz de agua al día para evitar el estreñimiento.

***Iniciales _____

No consuma este medicamento si:

- Usted tiene una historia personal o familiar de Cancer de tiroide
- Historia de Síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple
- Esta embarazada o planea quedar embarazada mientras toma este medicamento
- Usted es diabético y/o toma medicamentos para la diabetes (debe hablar con su Endocrinólogo)
- Especialmente si usa insulina ya que su uso combinado incrementa el riesgo de hipoglucemia (azúcar baja). Necesitará un cambio en la dosis de sus medicamentos
- Usted tiene historia de Pancreatitis o es alérgico a BPC-157, Semaglutide o cualquier otro medicamento en su clase como: Adlyxin, Byetta, Bydureon, Ozempic, Rybelsus, Trulicity, Victoza, Wegovy.

***Iniciales _____

Puede existir una interacción desfavorable si se usa con otros agentes anti-diabéticos, especialmente: insulina y sulfonilureas (Lyburide, Glipizide, Imepiride, Tolbutamide) debido a el alto riesgo de eventos hipoglucémicos (azúcar baja)

Posibles efectos adversos incluye: náusea, diarrea, vómito, estreñimiento, dolor abdominal, dolor de cabeza, fatiga, mareo, dispepsia, gases, hipoglucemia, gastroenteritis, y reflujo gastroesofágico. Inyecciones subcutáneas: las reacciones mas comunes incluyen escozor en el área de inyección, sensación de ardor después de administrar el medicamento, pequeños hematomas en el área de inyección (morados). Si nota algún otro efecto secundario contacte a su médico o farmacéuta.

***Iniciales_____

Una reacción alérgica seria a este medicamento es rara, No obstante, busque atención medica urgente si nota síntomas de reacción alérgica seria que incluye sarpullido, picazón e hinchazón (especialmente si se le hinchan la cara, las mucosas, los labios, la lengua, si siente dificultad al tragar), mareo severo, dificultad al respirar. En dado caso busque atención medica de emergencia o llame al 911 inmediatamente.

***Iniciales_____

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O DUDA SOBRE LOS RIESGOS DE ESTE TRATAMIENTO O CUALQUIER OTRO POSIBLE TRATAMIENTO, PREGUNTE A ALGUN MIEMBRO DE NUESTRA OFICINA ANTES DE FIRMAR ESTE CONSENTIMIENTO.

Al firmar, Yo certifico que he leído y entendido el contenido de esta forma. Se me ha informado de los posibles efectos secundarios e interacciones con otros medicamentos y doy mi consentimiento para este tratamiento. Yo le he comunicado al personal de salud de cualquier alergia a medicamentos o sustancias, y cualquier evento adverso que haya experimentado en el pasado. También he informado todos los medicamentos y suplementos que estoy utilizando actualmente.

Entiendo que existen otros métodos y programas que pueden asistir a obtener resultados de control de peso y también entiendo que no se me ha hecho ninguna garantía al respecto de mis resultados personales.

Nombre completo_____ Firma_____

Telefono_____

Fecha de Nacimiento_____

Direction de envio (si aplica)_____
